

## Il calendario vaccinale

Età	Vaccino
3° mese	Esavalente - Pneumococco - Meningococco B I dose
4°-5° mese	Esavalente - Pneumococco - Meningococco B II dose
7° mese	Meningococco B III dose
11° mese	Esavalente - Pneumococco III dose
13°-15° mese	MPR - Meningococco C
17° mese	Varicella - Meningococco B IV dose
5-6 anni	MPR - Varicella* - Richiamo di Polio e DTP

\*a partire dai nati nel 2014

### Legenda:

- **Esavalente:** vaccino a 6 componenti, contro le seguenti malattie: difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B ed emofilo.
- **MPR:** vaccino a 3 componenti, contro le seguenti malattie: morbillo, parotite e rosolia.
- **DTP:** vaccino a 3 componenti, contro le seguenti malattie: difterite, tetano e pertosse.

## Per saperne di più

Rivolgersi ai medici o agli assistenti sanitari dei Servizi vaccinali dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (vedi recapiti sul retro) o al pediatra di fiducia

Visitare i siti:  
[www.ministerosalute.it](http://www.ministerosalute.it)  
[www.vaccinarsi.org](http://www.vaccinarsi.org)

## A chi rivolgersi per maggiori informazioni

### DISTRETTO CENTRO NORD Trento

Centro per i servizi sanitari  
 viale Verona, pal. D  
 0461 902247

### DISTRETTO EST Pergine Valsugana

via San Pietro, 2  
 0461 515200  
 0461 515208

**Borgo Valsugana**  
 viale Vicenza, 9  
 0461 755611

**Tonadico**  
 via Roma, 1  
 0439 764424

**Cavalese**  
 via Dossi, 17  
 0462 242183

**Pozza di Fassa**  
 strada di Prè de Gejja, 4  
 0462 761000

### DISTRETTO OVEST Cles

via Degasperì, 41  
 0463 660369

**Malè**  
 via 4 Novembre, 8  
 0463 909430

**Mezzolombardo**  
 via Manzoni, 1  
 0461 611293

**Cembra**  
 via Marconi, 7  
 0461 683711

### DISTRETTO CENTRO SUD Rovereto

piazza Leoni, 11/A  
 0464 403706

**Arco**  
 largo A. A. d'Asburgo, 1  
 0464 582588

**Tione di Trento**  
 via Presanella, 16  
 0465 331428

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari © Copyright 2016  
 tutti i diritti riservati riproduzione consentita con citazione obbligatoria della fonte

Collana Promozione della salute  
 Azienda provinciale per i servizi sanitari  
 via Degasperì 79, 38123 Trento

Testi a cura: Unità operativa igiene e sanità pubblica - Dipartimento di prevenzione

Coordinamento editoriale: Servizio comunicazione interna ed esterna

Progetto grafico: OnLine Group - Roma

Finito di stampare nel mese di agosto 2016

[www.apss.tn.it](http://www.apss.tn.it)



## Le vaccinazioni del primo anno di vita



Azienda Provinciale  
 per i Servizi Sanitari  
 Provincia Autonoma di Trento

## Cari genitori,

le vaccinazioni dell'infanzia sono molto importanti perché proteggono il bambino dal rischio di gravi malattie e dalle loro complicanze. I vaccini stimolano le difese immunitarie naturali del bambino e lo rendono capace di resistere alle infezioni.

Le vaccinazioni proteggono sia il singolo bambino sia l'intera collettività; un'elevata adesione alle vaccinazioni, infatti, impedisce la diffusione delle malattie e pone le condizioni per l'eliminazione delle malattie stesse. Nel primo anno di vita tutti i bambini dovrebbero essere vaccinati nei confronti di otto malattie importanti: poliomielite, difterite, tetano, pertosse, epatite B, meningiti e altre infezioni da emofilo, pneumococco e meningococco B.

È importante vaccinare il bambino all'età prevista dal calendario vaccinale, senza ritardare o rinviare le vaccinazioni; alcune di queste malattie infatti sono più frequenti e più temibili proprio nei primi mesi di vita e per questo è importante proteggere il bambino il più presto possibile.

I bambini, dopo 60 giorni dalla nascita, età minima stabilita per le vaccinazioni previste nel calendario, sono in grado di rispondere in maniera ottimale ai vaccini, senza alcun aumento degli effetti collaterali osservati; non vi sono motivi per rinviare le vaccinazioni!

## ■ Quali sono le vaccinazioni del primo anno di vita?

Nel primo anno di vita tutti i bambini dovrebbero essere vaccinati nei confronti di otto malattie importanti: poliomielite, difterite, tetano, pertosse, epatite B, meningiti e altre infezione da emofilo, pneumococco e meningococco B.

Per proteggere da queste malattie sono di solito impiegati i seguenti vaccini:

### • **Esavalente**

È un vaccino combinato che consente, con una sola iniezione, di proteggere il bambino contro 6 (in greco esa) malattie: poliomielite, tetano, difterite, pertosse, epatite B, emofilo.

La vaccinazione contro queste malattie è considerata universalmente prioritaria.

I vaccini combinati sono efficaci quanto i vaccini singoli, sono sicuri e non determinano un aumento degli effetti collaterali.

### • **Pneumococco**

Protegge dalla meningite e da altre infezioni gravi determinate dal germe pneumococco. La vaccinazione ha un'ottima efficacia nei confronti del 70-80% degli pneumococchi che causano malattia invasiva. Viene eseguito nella stessa seduta vaccinale dell'esavalente.

### • **Meningococco B**

Protegge dalla meningite e da altre infezioni gravi determinate dal germe meningococco B. Viene somministrato in sedute diverse, a breve distanza dagli altri due vaccini.

*È importante non ritardare e non rinviare le vaccinazioni per proteggere il bambino fin dai primi mesi di vita.*

## ■ Invito per le prime dosi

Viene effettuato dopo il compimento del secondo mese di vita del bambino. L'invito per le prime dosi prevede **due appuntamenti in date diverse distanziate l'una dall'altra di 15 giorni o poco più**. Il primo appuntamento è per eseguire la somministrazione dei seguenti due vaccini (due iniezioni):

- Esavalente 1<sup>a</sup> dose
- Pneumococco 1<sup>a</sup> dose

Il secondo appuntamento è per eseguire il vaccino:

- Meningococco B 1<sup>a</sup> dose

*IMPORTANTE: Per eseguire tutti e tre i vaccini è necessario rispettare le date degli appuntamenti. In caso di rinvio di uno degli appuntamenti è sempre raccomandato dare la priorità alla somministrazione di esavalente e pneumococco (per maggiori informazioni rivolgersi agli operatori sanitari del servizio vaccinale che manda l'invito).*

## ■ Invito per le seconde dosi

I bambini che hanno effettuato le prime dosi di tutti e tre i vaccini previsti ricevono, dopo 30 gg. circa, l'invito per le seconde dosi delle vaccinazioni. L'invito per le seconde dosi prevede due appuntamenti in date diverse distanziate l'una dall'altra di 15 giorni o poco più. Il primo appuntamento è per eseguire la somministrazione del vaccino:

- Meningococco 2<sup>a</sup> dose

Il secondo appuntamento è per eseguire la somministrazione dei seguenti i due vaccini:

- Esavalente 2<sup>a</sup> dose
- Pneumococco 2<sup>a</sup> dose

*IMPORTANTE: I bambini che non hanno effettuato la prima dose di meningococco B riceveranno l'invito solo per le seconde dosi di esavalente e pneumococco. Per eseguire tutti e tre i vaccini è necessario rispettare le date degli appuntamenti anche per le seconde dosi. In caso di rinvio di uno degli appuntamenti è sempre raccomandato dare la priorità alla somministrazione di esavalente e pneumococco (per maggiori informazioni rivolgersi agli operatori sanitari del servizio vaccinale che manda l'invito).*

## ■ Invito per la terza dose

Per il completamento del ciclo di base con la terza dose, i genitori ricevono due inviti separati alle scadenze previste dal calendario vaccinale (a 7-8 mesi di vita per meningococco B; a 11-12 mesi di vita per esavalente e pneumococco).

## ■ Controindicazioni

Prima di eseguire la vaccinazione il medico o l'assistente sanitario del centro vaccinale porrà alcune domande per escludere l'esistenza delle rare condizioni di salute che controindicano o sconsigliano la vaccinazione (anamnesi pre-vaccinale).

È bene riferire sempre su eventuali malattie, accertamenti sanitari o terapie in corso. In caso di dubbi non esitate a chiedere spiegazioni.

Se il giorno della vaccinazione il bambino ha una malattia febbrile acuta in atto è bene spostare la vaccinazione a dopo la guarigione; i bambini con disturbi lievi, come raffreddore, un po' di tosse, qualche linea di febbre, possono essere tranquillamente vaccinati.

## ■ Effetti indesiderati

La maggior parte dei bambini non manifesta alcun problema dopo la vaccinazione. I più comuni sono rappresentati dalla febbre, anche superiore ai 38 °C, che può comparire entro poche ore dall'iniezione e dalle reazioni locali in sede di inoculazione quali dolore, arrossamento e gonfiore. Queste reazioni sono di breve durata e scompaiono entro qualche giorno. Raramente si possono manifestare irrequietezza o pianto inconsueto. Le reazioni gravi, seppur possibili, sono rarissime; va ricordato che i rischi legati alle vaccinazioni sono molto più bassi dei rischi derivati dalle malattie verso cui essi proteggono.

## ■ Come controllare le più comuni reazioni al vaccino

In caso di reazione locale (dolore, gonfiore e arrossamento nella sede di iniezione) è possibile applicare un impacco freddo per diminuire l'infiammazione (se si usa il ghiaccio bisogna avvolgerlo in un panno di cotone per evitare il contatto diretto con la pelle). Per controllare la febbre e il dolore è possibile somministrare un antipiretico ai dosaggi indicati.

Se queste reazioni persistono nonostante gli accorgimenti consigliati oppure se si manifestano reazioni più gravi, è opportuno rivolgersi al proprio medico.

Le reazioni gravi, seppur possibili, sono rarissime; va ricordato che i rischi legati alle vaccinazioni sono molto più bassi dei rischi derivati dalle malattie verso cui essi proteggono.